

Empyema necessitatis

Empyema necessitatis

Unter dem Begriff „*Empyema necessitatis*“ versteht man ein langsam durch einen Zwischenrippenraum nach außen durchbrechendes Pleuraempyem.

Das Bild kommt von Dr. Eberhard Biermann aus München. Es stammt aus seiner Tätigkeit bei den „German Doctors“ www.german-doctors.de/de/ in den Müllbergen von Manila („smokey mountains“). Gleich zu Beginn seiner Arbeit sah er einen achtjährigen Jungen, der beim Abhören über einer Lungenhälfte kein Atemgeräusch hatte und eine vollständige Dämpfung

des Klopfschalls. Biermann schreibt: „Da ich vorher die hervorragende Bild-CD des Dermatologen der German Doctors ‚durchgeackert‘ hatte, ahnte ich, was hier los war: tuberkulöses Pleuraempyem mit Durchbruch in kalte Abzesse. Der Junge bekam mit Mühe ein CT und eine anti-TB-Behandlung, wird wohl Residuen davontragen, was angesichts der sozialen Lage (Vater Müllsucher, sieben Geschwister, keine Versicherung) keine guten Aussichten für ein normales Leben bedeutet“.



Abbildung Achtjähriger Junge mit tuberkulösem Pleuraempyem Foto: Eberhard Biermann